



## GANGLION VAN IMPARBLOKKADE

Het ganglion van Impar is een zenuwknoop van het autonome zenuwstelsel. Het ligt op de overgang van het heiligbeen en staartbeen. Het ganglion van Impar is belangrijk voor de behandelingen van pijnklachten vanuit het staartbeen, de endeldarm, de geslachtsorganen en het gebied rond de anus.

*Door een blokkade van het ganglion van impar kan het pijnsignaal voor langere tijd verminderd worden doorgegeven.*

### Vorbereiding behandeling

#### *Bloedverduunners*

De pijnspecialist vertelt u als u moet stoppen met uw bloedverduunners. Zorg dat u weet hoeveel dagen u voor uw behandeling met de bloedverduunners moet stoppen en wanneer u weer mag beginnen hiermee.

#### *Overige medicatie*

Deze kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.

#### *Eten en drinken*

U mag voor de behandeling alles eten en drinken.

#### *Kleding en sieraden*

Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te behandelen gebied.

#### *Begeleiding naar huis*

U mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg dat er iemand is om u op te halen na de behandeling.

#### *Ook belangrijk*

Meld voor de behandeling altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige of:

- u (mogelijk) zwanger bent
- u allergisch bent voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
- u een pacemaker of ICD heeft

Neem voor de behandeling contact op met het Pijncentrum als:

- u geen pijn of klachten meer heeft
- u de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft

### De behandeling

#### *Behandeling met medicatie*

Met behulp van röntgenstralen brengt de arts een naald in bij de bilnaad, in de buurt van het ganglion van Impar. Hij controleert met contrastvloeistof of de naald op de juiste plaats staat. Vervolgens wordt er verdovingsvloeistof met ontstekingsremmers ingespoten om het ganglion van Impar te blokkeren. De pijn kan hierdoor langere tijd verminderd worden doorgegeven. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

## Na de behandeling

### *De dag van de behandeling*

- Na de behandeling verblijft u kort op de verpleegzaal ter observatie, hierna kan u naar huis.
- U kunt tijdelijk minder kracht of een doof gevoel hebben in uw benen. Dit komt door de verdovingsvloeistof en verdwijnt na enkele uren.
- Tijdelijke blaasfunctiestoornissen. Wij adviseren u daarom om op tijd gebruik te maken van het toilet, het kan een aantal uur voorkomen dat u niet kan voelen dat u aandrang heeft.
- De dag van de behandeling kunt u uw activiteiten weer doen zoals u gewend bent.

### *Wat kunt u verwachten?*

- Na 4 tot 8 weken kunnen we het resultaat van de behandeling beoordelen. Rond deze tijd krijgt u een controleafspraak.
- Soms is een aanvullende behandeling nodig.

### *Mogelijke complicaties en bijwerkingen*

Zoals bij iedere behandeling bestaat er een kleine kans op complicaties:

- Een bloeding
- Een infectie. Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
- Als er ontstekingsremmers (corticosteroïden) zijn ingespoten, kunt u ongeveer 3 dagen na de behandeling last hebben van bijwerkingen. Deze gaan vanzelf weer over.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

- Een rood of warm gezicht
- Opvliegers
- Ontregelde menstruatie. De anticonceptiepil kan gedurende één cyclus minder betrouwbaar zijn.
- Spierkrampen
- Verhoogde bloedsuikerspiegel. Heeft u diabetes (suikerziekte)? Controleer dan de eerste dagen na de behandeling regelmatig de bloedsuikerspiegel.

### **Contactinformatie**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Pijnbestrijding:

Locatie Emmastraat  
Emmastraat 42  
1075 HW Amsterdam  
020 – 305 58 80

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

### **Heeft u een klacht?**

Op onze website [www.jvg.nl](http://www.jvg.nl) vindt u ons klachtenreglement onder: patiëntinformatie – klachten.